

# Procedure afmelden Wilde Zwijnen

Gerard Bosmans

Zwartwild coördinator Noord-Brabant

## Rol zwartwild coördinator

- Bloed ontvangen van elk dood wild zwijn
  - Geschoten
  - Aangereden
  - Gevonden
- Per zwijn 1 buisje bloed, te verkrijgen en leveren via (coördinator) WBE
- Loodje via (coördinator) WBE

## Onderzoek bloedmonster

- Bloedmonster worden op gestuurd naar Wageningen Bioveterinary Research (voorheen GD)
- Bloed wordt steekproefsgewijs getest op AVP, KVP en Aujeszky
- Dit is circa 25% van de ingezonden bloed monsters
- Indien uitslag positief wordt er meteen actie ondernomen en volgt een terug koppeling
- Uitslag negatief, geen terugkoppeling

## Data melden via FRS

- Coördinator heeft inzage in FRS
- Wij willen beschikken over kwalitatieve betrouwbare data
- Gewicht niet schatten, maar correct wegen
- Leeftijd niet schatten maar bepalen aan de hand van leeftijd bepaling
- Grafieken FBE behoren voorzien te zijn van de juiste gegevens

## Data melden via FRS

- Big of frysling is een zwijn van 0 tot 12 maanden
- Overloper is een zwijn in zijn 2<sup>e</sup> levensjaar
- Vaak worden fouten gemaakt in het afmelden in FRS
- Niet schatten maar leeftijd bepalen o.b.v. gewicht, maar:
  - Op uiterlijk kop (jeugdig)
  - Op lengte staart (al op voerplek te zien)
  - En met name o.b.v. gebit

# Leeftijd o.b.v. gebit

### Leeftijdsbepaling Wild Zwijn



**BIG**  
Alleen melktanden (1,2,3)  
0-10 maanden

**OVERLOPER**  
Wisseling van slagtanden en korte snijtanden (III)  
10-14 maanden

**OVERLOPER**  
Binnenste snijtanden gewisseld (I), nog niet op lengte  
Circa 15 maanden

 De Baronie van Cranendonck 

### Leeftijdsbepaling Wild Zwijn



**OVERLOPER**  
Middelste snijtanden (I) uitgegroeid (met groef)  
17-18 maanden

**OVERLOPER**  
Alle snijtanden gewisseld, (II) nog niet op lengte  
19-20 maanden

**VOLWASSEN ZWIJN**  
Tandwisseling afgesloten  
I en II op één lijn  
2 jaar of ouder

## Het nemen van een bloedmonster

- Tijdens het ontweiden
- Wild zwijn op rug leggen
- Bloed bij voorkeur afnemen in borstholte (schoon)

## Trichinella

- *Trichinella spiralis* is een parasiet die in rauw vlees van zwijnen kan voorkomen, nauwelijks infecties in Nederland, maar wel in Oost Europa
- Testen wettelijk verplicht indien het vlees niet voor eigen gebruik is
  - Voorkom dood door schuld
- Kosten circa 19 euro per monster (max. 10 zwijnen uit 1 gebied)
- Voor het onderzoek 100 gram spierweefsel van middenrif of voorpoot
- Aanleveren spierweefsel voor onderzoek kan samen met bloedmonster



## DNA onderzoek

- Tot heden van elk geschoten zwijn een stukje weefsel aanleveren voor DNA onderzoek
- Vanaf heden alleen van zwijnen vanaf 2 jaar en van alle geschoten zwijnen in “nieuwe” gebieden
- Jaarlijks, indien budget beschikbaar, onderzoek door Alterra
- Doel is bepalen afkomst en creëren van zicht op verspreiding

## Protocol dood gevonden wild zwijn

- Neem direct contact op met de NVWA, 045-5463188.
- NVWA informeert de zwartwildcoördinator. Hij heeft instructies over hygiëne en monsternamen en beoordeelt het kadaver
- Draagt daarbij beschermde kleding enz.

- Wanneer betreft het een verdacht kadaver?
  - Indien er geen sporen zijn van aanrijding
  - Indien er geen sporen zijn van afschot of stroperij
  - Bij verdenking van een verdacht kadaver NVWA informeren
  - Het kadaver niet verwijderen van de vindplaats
  - Pas na laboratoriumuitslag besluit wat er met kadaver moet gebeuren

# Ingewanden

- Indien in het veld ontweid mogen de ingewanden daar blijven
  - Hoeft in tegenstelling tot eerder bericht niet te worden begraven
- De ingewanden van elders ontweide zwijnen mogen niet naar de natuur
- Ingewanden dan via grijze kliko of via gemeente afvoeren
- Enkele WBE's hebben geregeld dat leden de ingewanden via de gemeente kunnen afvoeren

# Gerealiseerde afschot

- 2015-2016 268
- 2016-2017 557
- 2017-2018 688
- 2018-2019 503 tot en met heden